


江门市新会区农业农村局

关于转发切实做好晚稻后期褐飞虱 防控工作的紧急通知

各镇（街）农业和农村工作办公室：

现将市农业农村局《关于切实做好晚稻后期褐飞虱防控工作的紧急通知》转发给你们，请按照文件要求，结合实际，切实做好晚稻后期褐飞虱防控工作，确保晚造水稻生产安全。



公开方式：主动公开

江门市农业农村局

关于切实做晚稻后期褐飞虱 防控工作的紧急通知

蓬江、江海区农业农村和水利局，各市（区）农业农村局：

当前我市晚稻进入灌浆—乳熟期、黄熟期，是产量形成的重要时期，也是重大病虫防控的关键时节。近期，受冷空气持续南下影响，我市已发现褐飞虱为害晚稻，局部地区呈大发生态势，据监测，发现部分严重田块百丛虫口密度高达 20000—30000 头，甚至出现稻田禾苗倒伏“穿顶”现象。我市部分稻区潜在稻飞虱暴发为害风险，防控形势严峻。为切实做好晚稻后期褐飞虱防控工作，确保晚造水稻生产安全，现就有关做好晚稻后期褐飞虱的防控工作紧急通知如下：

一、高度重视虫情，确保责任落实

各地要提高思想认识，认真贯彻《农作物病虫害防治条例》要求，加强褐飞虱防控的组织领导和监督管理，切实增强紧迫感和责任感，层级将责任落实到镇、村，将褐飞虱防治作为当前保障粮食生产安全的重点工作来抓。积极采取有效措施，全力做好防控工作，努力降低为害损

失，坚决打赢“虫口夺粮”攻坚战，确保完成全年粮食总产量只增不减的总目标。

二、加强监测，积极落实各项科学防控措施

当前是稻飞虱防治的关键时期，各地要因地制宜，因田施策，广泛发动群众开展科学防控。

一要全面监测，及时发布预警。各地要加强病虫监测调查，认真做好系统监测与面上普查工作，监测面覆盖到乡到村，确保不漏地不漏田，增强调查的代表性和可靠性，尤其是漏治或防治效果差的田块要全面组织普查，全面掌握田间虫情，及时准确发布预警信息。

二要分类指导防治。由于各地水稻生育期不一，田间虫量差异较大，褐飞虱比例及虫龄差异明显，发生危害程度变化大，各地要结合当地褐飞虱发生情况和水稻生育期情况，实行分类防治，对虫量达到或超过防治指标的田块，要迅速组织和发动农户开展防治，对防治后田间虫量仍然较高的田块要及时做好补治工作。

三要科学用药，确保防效。选用对口防治药剂，轮换用药，保证防效，注意安全。当前水稻已接近成熟，要注意安全用药，建议使用高效低毒低残留农药，严格掌握农药安全间隔期，确保稻米安全。药物上可选用三氟苯嘧啶、氟啶虫胺腈、呋虫胺、噻嗪酮或吡蚜酮等药剂。喷药

时从田块外围向内喷药，防止褐飞虱向外逃逸，重点喷在稻丛中下部。施药时田间要保持浅水层。

三、强化督导，确保防控效果

各地要坚持农作物病虫害防治“政府主导、属地负责”原则，迅速组织调研指导组深入一线开展专项调研和技术指导服务，实时了解防控进展和防治效果。



公开方式：主动公开

