

江门市新会区人民政府办公室

新府办函〔2019〕360号

关于印发 2019 年新会区登革热、寨卡病毒病 防控工作方案的通知

各镇人民政府，经济开发区管委会、圭峰区管委会（会城街道办），
区有关单位：

《2019 年新会区登革热、寨卡病毒病防控工作方案》已经区人民政府同意，现印发给你们，请认真贯彻执行。执行过程中遇到的问题，请径向区卫生健康局反映。



公开方式：主动公开

2019年新会区登革热、寨卡病毒病防控工作方案

登革热和寨卡病毒病等均为蚊媒传播的急性传染病，两者有类似的临床症状和体征，以发热、全身肌肉和骨关节痛、皮疹、乏力为主要特征，一旦出现疫情，易造成广泛传播，为及时发现登革热和寨卡病毒病等蚊媒传染病，有效开展预测预警和应急处置措施，特制定本方案。

一、总体目标

健全政府主导、各部门分工负责、各类企事业单位和居民广泛参与的登革热和寨卡病毒病防控工作机制，全力开展疫情防控工作，有效落实各项预防控制措施，减少登革热和寨卡病毒病疫情对辖区居民健康和经济社会发展造成的不良影响。

二、防控策略

控制和消灭白纹伊蚊是当前最有效的预防和控制措施。各级各部门要各司其职，形成合力，及时通报病媒监测、评价以及登革热和寨卡病毒病等病媒传染病疫情，组织落实中高密度监测点孳生地治理，充分发动群众开展室内外蚊虫孳生环境整治，将蚊媒密度控制在合理水平。

三、工作任务

（一）建立联防联控联动机制。

建立健全政府主导、多部门合作的联防联控机制，落实综合防控措施。各镇（街、区）要健全登革热和寨卡病毒病防控领导机构，加强对辖区防控工作的领导，投入必要的防控经费，协调、

督促辖区各有关部门和村（居）执行防控方案，落实各项防控措施。卫生健康部门加强全区登革热和寨卡病毒病防控工作的指导，组织开展蚊媒、疫情监测，定期通报疫情和存在问题，分析、研究疫情发展趋势，针对存在的问题提出解决方案。区疾控中心要加强蚊媒监测工作，强化关口前移，提高监测敏感性。区疾控中心、各镇（街、区）卫生计生部门要建立病媒生物防制快速联动机制，做好病媒监测、评价以及登革热和寨卡病毒病等病媒传染病疫情等信息的及时互通，各镇（街、区）、各单位接到蚊媒监测通报后要迅速行动，组织落实中高密度监测点孳生地治理并逐级上报。

（二）强化疫情监测与处置。

加强传染病监测预警，完善提升医疗卫生机构疫情网络直报、疫情监测、病媒监测和网络舆情监测等能力，确保疫情准确发现与报告。加强疫情监测报告和风险评估，分析研判并及时发现传染病疫情暴发流行风险。发现病例后，要规范疫情处置，做好病例防蚊隔离，严格做到“早发现、早报告、早治疗、早处置”。发现本地感染病例后，应在疫点主动搜索可疑病例，及时诊断、处理，防止疫情蔓延。已出现聚集性病例的地区，要根据疫情态势，及时启动相应级别应急响应，果断采取防控措施。

（三）加大环境卫生整治力度。

1.开展环境卫生整治统一行动。严格执行广东省爱卫会《关于机关团体企事业单位率先落实“三个一”环境卫生整治制度的通知》（粤爱卫〔2018〕12号）精神，使“三个一”环境卫生制度落

- 3.医疗机构防蚊灭蚊工作指引（2018 年版）
- 4.建筑工地防蚊灭蚊工作指引（2018 年版）
- 5.公园苗圃花卉市场防蚊灭蚊工作指引（2018 年版）
- 6.各类场所化学快速杀灭成蚊指引（2018 年版）

也可采用市售灭蚊片，按使用说明书一般 15m² 使用 1 片，点燃后关闭门、窗，0.5~1 小时后再打开门、窗通风 20 分钟后，人方可进入室内。

如工地需要大面积杀灭成蚊，建议聘请专业的有害生物防制度公司开展杀灭成蚊工作，化学法快速杀灭成蚊方法主要有超低容量喷雾法及热烟雾剂法；化学法持续滞留杀灭成蚊的方法有室内滞留喷洒法及室外绿篱技术喷洒法。

三、药物使用安全注意事项

必须选用有农药登记证的卫生用杀虫剂。本指引中推荐的药物都是对人畜毒性较低的卫生杀虫剂，但仍需注意安全，需将药物保存在儿童不易获取的地方，避免儿童触碰或误食。同时接触药物后应洗手。

