

广东江门新会经济开发区管理委员会 文 件

新开管委〔2019〕14号

关于印发《2019年新会经济开发区登革热 防控工作方案》的通知

开发区管委会各办公室、招商局、人社所、水利所，区直派驻开发区各有关机构，今古洲社区居民委员会，开发区医院：

《2019年新会经济开发区登革热防控工作方案》经研究同意，现印发给你们，请认真贯彻执行。

特此通知。

新会经济开发区管理委员会

2019年5月8日



2019年新会经济开发区登革热 防控工作方案

登革热是一种通过白纹伊蚊叮咬传播的急性传染病，传播迅猛，发病率高，人群普遍易感，容易引起暴发流行，是新会区重点防控的传染病之一。为有效预防和控制登革热疫情，根据区政府对2019年登革热防控工作的统一部署，结合开发区实际，制定本实施方案。

一、工作目标

健全政府主导、各部门分工负责、各类企事业单位、在建工地和居民小区广泛参与的登革热防控工作机制，全力开展登革热防控工作，有效落实各项登革热预防和控制措施，减少乃至消除登革热疫情对辖区居民健康和经济社会发展造成的不良影响。

二、防控策略

控制和消灭白纹伊蚊是当前最有效的预防和控制登革热的措施。开发区各部门、单位、厂企、社区要各司其职，形成合力，及时通报病媒监测、评价以及登革热等病媒传染病疫情，组织落实中高密度监测点孳生地治理，充分发动群众开展室内外蚊虫孳生环境整治，将蚊媒密度控制在合理水平。

三、工作任务

（一）建立联防联控联动机制。

建立健全政府主导、多部门合作的联防联控机制，落实综合防控措施。开发区登革热防控领导机构要加强对辖区登

革热防控工作的领导，投入必要的防控经费，协调、督促辖区各有关部门单位、厂企、工地、社区和物管小区执行防控方案，落实各项防控措施。开发区医院加强辖区登革热防控工作的指导，组织开展蚊媒、疫情监测，定期通报疫情和存在问题，分析、研究登革热防控形势，针对存在的问题提出解决方案。成立开发区登革热防控工作微信群，设立联络员，畅通开发区有关部门信息对接，确保病媒监测、评价以及登革热等病媒传染病疫情等信息的及时互通。

（二）强化疫情监测与处置。

加强传染病监测预警，完善提升医疗卫生机构疫情网络直报、疫情监测、病媒监测和网络舆情监测等能力，确保疫情准确发现与报告。加强疫情监测报告和风险评估，分析研判并及时发现传染病疫情爆发流行风险。发现登革热病例后，要规范疫情处置，做好病例防蚊隔离，严格做到“早发现、早报告、早治疗、早处置”。发现本地感染病例后，应在疫点主动搜索可疑病例，及时诊断、处理，防止疫情蔓延。已出现聚集性病例的地区，要根据疫情态势，及时启动相应的登革热防控应急响应，果断采取防控措施。

（三）加大环境卫生整治力度。

1. 开展环境卫生整治统一行动。严格执行广东省爱卫会《关于机关团体企业单位率先落实“三个一”环境卫生整治制度的通知》（粤爱卫〔2018〕12号）精神，使“三个一”环境卫生制度落到实处。各部门、单位、厂企要部署、发动并督促本单位按照要求统一开展单位内外的环境卫生整治行动。公用事业办、规划建设环保办和今古洲社区要加强区

内主干道和内街内巷公共外环境、建筑工地和物业小区、公园、学校、医院等重点区域的环境卫生整治，开展清理室内外积水，及时、有效清除蚊媒孳生地。坚持推行环境卫生网格化管理，由开发区按照属地管理原则组织社区和督促有关机关、社会团体单位每周进行1次环境卫生大扫除，严格落实“门前三包”制度和门内卫生达标责任制。

2. 抓好重点区域清理整治工作。大力开展环境卫生整治行动，有本地登革热疫情发生和输入病例的单位、厂企、工地、小区要开展疫点及周边环境整治，重点清理城乡结合部、河道两旁和居民区周边的垃圾，集中力量消灭卫生死角、各类积水等蚊媒孳生地。对大型水体和暂不能处理的积水投放灭幼缓释剂。

3. 强化辖区单位防控登革热疫情主体责任。按照“以块为主，属地管理”和“谁主管，谁负责”的原则，针对发生登革热疫情区域、蚊媒密度高以及存在登革热传播中度风险以上的区域，要及时组织人员开展室内外清理积水和灭蚊工作。要明确责任，责任到人，实行网格化管理。重点区域的居民户登记造册，每个小区、每一户都要落实到人。要挨家挨户上门派发宣传单，指导清查积水。入户时重点关注天台、楼梯间、地下室和卫生死角等积水的清除。

（四）加强培训和技术指导。

大力开展专业队伍培训，提高疾病监测、流行病学调查、卫生检验、健康教育、疫情处置、消毒杀虫等专业人员的技术水平，确保工作质量。开发区管委会要建立健全防控登革热疫情应急处置队伍。5月份前，开发区医院要开展一次登

革热知识培训，提高医护人员对登革热的诊疗水平，做到早诊断、早报告、早隔离、早治疗，确保发生疫情时能快速、高效处置。

（五）深入开展宣传发动。

开展多层次、多渠道的宣传活动，充分利用媒体、墙报、入户分发宣传单等形式，广泛开展防蚊灭蚊知识宣传，使广大群众充分了解防蚊灭蚊、防控登革热的目的、意义。同时，要强化舆论监督，对防控登革热执行不力的部门和单位要在媒体上予以曝光，发挥媒体监督作用。

（六）强化防控工作督导力度。

充分发挥爱国卫生运动在登革热防控工作中的平台作用，切实开展环境卫生整治。开发区要加强防控工作督导，实行责任落实、分片包干管理。开发区登革热防控工作领导小组要组织开展环境卫生、蚊媒监测等督导工作，特别是对重点地区、重点场所、重点环节要加强督导检查，督促落实整改措施，确保防控工作有序有效。开发区各有关部门要定期对重点区域内的工地、学校、商场、公园、医院等所有单位的内外环境蚊虫孳生地情况进行全覆盖检查，做好检查记录，并督促各单位及时清除存在的卫生死角以及各类积水等蚊媒孳生地。

四、组织领导

根据《新会经济开发区防治重大疾病工作联席会议制度》，由联席会议成员单位组成登革热防控工作小组，全面加强对病媒生物防制工作领导和统筹协调。

五、主要工作职责与分工

根据《广东省病媒生物预防控制管理规定》，按照“政府组织，分级负责，属地管理，部门协调，全民参与”的原则，开发区各部门单位要各司其职，各负其责，齐抓共管，密切配合，广泛宣传，联防联控，全面完成辖区内登革热防控工作。

（一）公用事业管理办：联同开发区医院、今古洲社区做好蚊虫密度的监测工作，并根据监测结果指导登革热防控工作开展，保证有效降低蚊媒密度，确保工作取得实效。加强辖区内公园（湖泊）、绿地、绿化带等地的建设和管理；负责做好环卫设施的维护和管理；落实公厕、垃圾中转站、垃圾桶、果皮箱、垃圾车等清扫保洁；加强区内主次干道清扫保洁工作；组织人员定期对开发区公共区域进行灭蚊喷杀。通过开发区登革热防控工作微信群，收集各单位的登革热防控工作图片及数据，向卫健、疾控中心等部门上报开发区登革热防控情况。对接卫健、疾控中心等部门进行登革热防控各项工作。

（二）今古洲社区：按照病媒生物防制属地管理原则，全面负责社区辖区登革热防控工作。组织开展“四害”孳生地和卫生死角本底调查；加强管辖区域居民区清扫保洁工作，发动小区物业和群众开展翻盆倒罐、填平坑洼、疏通沟渠、清理积水、清除蚊虫孳生地等城乡卫生整洁大行动；落实登革热防控灭蚊消杀工作；做好辖区除害防病、病媒生物密度监测；加大力度宣传登革热防控工作，在社区、小区宣传栏张贴登革热防控宣传海报，发放宣传单张，要求迅速开展实施居民区的灭蚊消杀并组织动员群众开展翻盆倒罐，清

理积水。负责协调、指导和督促有物业管理的住宅小区落实登革热防控工作，督促物业服务企业及时报送蚊虫消杀、清理积水的数据和图片。

（三）规划建设环保办：负责通知辖区在建工地做好登革热防控宣传，指导在建工地落实登革热防控工作的各项措施，重点抓好在建工地地下室蚊虫孳生地治理及清除一切积水和积污场所，按要求开展定期蚊虫消杀；负责收集在建工地登革热防控工作的数据、图片等资料的收集。

（四）经济发展办：负责组织辖区内厂企单位加入开发区登革热防控工作微信群；通过开发区商会微信公众号等对企业开展登革热防控知识宣传；要求企业做好翻盆倒灌清理积水和蚊虫孳生地及按要求定期开展蚊虫消杀等工作。

（五）开发区医院：开展登革热防范知识等爱国卫生教育，组织开展登革热媒介监测，对辖区周围进行病例搜查，发现疑似病例及时通报相关管理部门，协助开发区做好登革热病例的处置工作。

（六）开发区市场监督管理所：督促各类宾馆饭店、药品经营单位、食品生产加工单位、食品销售和餐饮服务门店及个体工商户做好卫生管理工作，清除蚊虫孳生地和栖息场所，及时消灭成蚊。

（七）开发区其他部门单位：根据《广东省病媒生物预防控制管理规定》要求，按照部门职责和管辖范围，积极发动干部职工做好室内外环境卫生、清理积水、清除卫生死角和完善病媒生物防制设施，落实本单位病媒生物防制措施，提升本部门及本行业的病媒生物防制工作质量和水平。

（八）辖区内各厂企、在建工地：负责厂企、在建工地内登革热防控工作。组织开展“四害”孳生地 and 卫生死角本底调查；加强管辖范围清扫保洁工作，开展翻盆倒罐、填平坑洼、疏通沟渠、清理积水、清除蚊虫孳生地等卫生整洁行动；落实登革热防控灭蚊消杀工作；配合有关部门做好厂区内除害防病、病媒生物密度监测；加大力度宣传登革热防控工作。通过开发区登革热防控工作微信群，每次消杀后将收集到的本单位登革热防控工作图片及数据上传汇总。

六、工作安排

（一）开展环境整治清理积水及蚊虫孳生地。

自本方案印发之日起，全面开展以“清除孳生地、清理积水、灭杀蚊虫”为主的爱国卫生运动，各单位要根据职能全面开展环境卫生整治工作，特别做好建筑工地、花卉苗圃、工厂宿舍、居民楼顶、地下沟渠、学校等重点区域、场所的清理积水和蚊虫孳生地的工作。

（二）持续开展大范围灭蚊行动。

从2019年5月至11月，要求每个月进行两次灭蚊大行动，原则上在每月第二、四周周五下午4时至7时为统一灭蚊时间（如遇天气问题，自行安排时间扑灭），要求辖区内部门单位、社区、厂企、小区物管、在建工地等统一开展灭蚊行动，聘请专业消杀公司对辖区公共外环境及非物管居民区实施蚊类控制消杀工作，相关单位要指导居民自觉开展居家灭蚊等工作。如有发生登革热疫情，根据疫情程度加强灭蚊消杀工作。

（三）按要求做好登革热蚊媒监测工作。

由公用事业办、开发区医院、今古洲社区及社区聘请物管公司管理人员共同组成开发区登革热蚊媒密度监测小组，按要求开展登革热蚊媒密度监测工作。2018年12月至2019年2月，辖区内蚊媒密度常规监测每月1次，并于每月底前上报区相关部门；2019年3月至2019年11月，常规监测每月2次，并于每月14日、29日前上报区相关部门；应急监测每周报一次，逢周一上报上一周监测结果。疫情发生时，随时按要求监测并上报。所有监测数据统一报到公用事业办，由公用事业办负责网报。公用事业办根据监测数据进行评估并提出防控建议。

（四）按要求开展登革热处置措施。

如收到区疾控中心发来关于辖区内登革热病例通报，开发区联络员要立即向主管领导报告，安排开发区医院、公用事业办、今古洲社区根据疾控中心的处置要求迅速做好病人资料核实、疫点蚊媒监测、清理积水、药物消杀灭蚊等措施。

七、工作要求

（一）加强组织领导。开发区各部门单位要充分认识登革热疫情防控的严峻性、持续性和反复性，切实加强组织领导，健全政府主导，强化协同协作机制，细化行动方案，落实防控经费，投入足够的人力、物力，保证各项防控工作落到实处、取得实效。

（二）统筹任务安排。开发区登革热防控领导机构负责对环境卫生整治统一行动和清除蚊媒孳生地工作进行再动员、再细化。各相关部门单位要统筹好防蚊灭蚊工作人力、物力。对疫点及周边重点区域的孳生地清理，要组织有经验

的专业队伍进行全覆盖清除、消杀，保质保量按时完成各项工作任务。

（三）深入督促检查。如发生本地感染病例和暴发疫情时，要加大检查、督促力度，逐级分解、压实责任，切实把责任压力传导到各个末端环节。要组织专门力量对辖区防蚊灭蚊的工作落实情况开展督导检查，全方位、全过程指导推进。对责任不到位、措施不落实、严重失职渎职导致发生大范围疫情暴发流行的，要严肃追责问责。

- 附件：1. 2019年新会经济开发区登革热防控工作责任清单
2. 新会区病媒生物预防控制有偿服务机构备案名单
3. 学校防蚊灭蚊工作指引（2018年版）
4. 医疗机构防蚊灭蚊工作指引（2018年版）
5. 建筑工地防蚊灭蚊工作指引（2018年版）
6. 公园苗圃花卉市场防蚊灭蚊工作指引（2018年版）
7. 各类场所化学快速杀灭成蚊指引（2018年版）

公开方式：主动公开

抄送：开发区党工委、管委会班子成员。

开发区管委会办公室

2019年5月8日印发

2019 年新会经济开发区登革热防控工作责任清单

工作任务	工作内容及要求	责任单位	完成时限	工作完成简要情况
一、健全登革热疫情联防联控工作机制。	1. 加强登革热防控工作的领导。制定开发区防治重大疾病工作联席会议制度，确定开发区防治重大疾病工作联席会议成员单位，明确各部门职责。协调各部门工作，落实灭蚊职责，分析防制形势，定期通报风险，指导登革热的防制工作和应急处置工作。	党政办 公用事业办	4 月底	
	2. 完善登革热疫情防控方案。制定开发区登革热疫情防控工作方案和年度工作方案。	公用事业办	4 月底	
	3. 加强检查督导。根据工作要求，切实加强辖区内登革热防控工作的督导，组织有关部门对各单位部门登革热防控工作进行检查，对没有落实登革热防控工作位的单位部门给予通报批评并要求限期整改，对没有落实登革热防控工作导致登革热等蚊媒传染病暴发流行、造成严重社会后果的，按提请相关部门追究相关责任人责任。	登革热防控工作小组 成员单位	年底	

工作任务	工作内容及要求	责任单位	完成时限	工作完成简要情况
一、健全登革热疫情联防联控工作机制。	4. 适时开展驻点防控。对疫情严重地区，根据实际情况组织专业队伍到疫情一线驻点防控，向相关单位提供防控技术支持，帮助查找薄弱环节和风险隐患，分析存在问题和困难，督促落实整改措施，确保防控工作有序开展。	开发区医院 公用事业办	年底	
二、广泛开展灭蚊防病宣传教育，切实有效动员社会各界和全民参与。	5. 各部门单位要充分利用两微一网（微信、微博和网站）、墙报、宣传栏广泛开展普及登革热防控知识，并积极参加防控登革热各项工作。 6. 开发区履行属地责任，充分利用两微一网、墙报、宣传栏、入户分发宣传单等全媒体形式，普及登革热防控知识，提高公众卫生责任和防病意识，动员群众自觉行动起来，清除积水，清理蚊虫孳生地，使用蚊帐纱窗和驱蚊剂，防止蚊虫叮咬。	登革热防控工作小组 成员单位	年底	
		党政办 今古洲社区	年底	

工作任务	工作内容及要求	责任单位	完成时限	工作完成简要情况
三、强化日常蚊媒防控工作,落实以环境治理为主的蚊媒控制措施,有效控制蚊媒密度。	7. 按照属地管理原则,以“块块为主,条条保证”的原则,根据灭蚊工作的内容、要求,充分发挥社区的作用,做好辖区内公共场所蚊虫孳生地清除、处理,以及辖区内厂企单位、建筑工地、居民住户的灭蚊组织发动工作。	公用事业办 今古洲社区 经济办 建环办	年底	
	8. 组织协调辖区内厂企单位、建筑工地、社区开展以防蚊灭蚊为重点的爱国卫生运动,组织指导区内厂企单位、建筑工地、社区开展以清除蚊虫孳生地为主要内容的环境综合整治活动,定期开展全民灭蚊统一行动,并对措施落实情况进行督查。	登革热防控工作小组 成员单位	年底	
	9. 根据登革热疫情防治技术方案,组织制定各项预防控制和医疗救治措施。落实门诊发热病人的登记制度,组织开展对医务人员的培训,强化医务人员登革热发现意识,提高诊断及救治能力。要及早发现、诊断重症病例,进一步提高重症病例救治水平。	开发区医院	年底	
	10. 做好登革热防控工作所必需经费的保障,加强对任务完成情况和财政资金使用,提高资金使用效率。	开发区财政分局	年底	

工作任务	工作内容及要求	责任单位	完成时限	工作完成简要情况
三、强化日常蚊媒防控工作,落实以环境治理为主的蚊媒控制措施,有效控制蚊媒密度。	11. 加强学校（包括幼儿园和托幼机构）病媒生物防制设施建设, 落实校园下水道沉沙井安装“四防装置”或“防蚊纱网”工作。组织实施各类学校、托幼机构的登革热疫情控制措施, 督促各类学校和托幼机构开展爱国卫生运动, 大搞环境卫生, 清除蚊虫孳生地。组织开展登革热防控知识讲座, 确保所有学生接受预防登革热健康教育课, 并发动学生回家清除蚊虫孳生地, 防止登革热疫情在校内发生和流行。做好在校学生、教职工的宣传教育和自我防护工作, 动员学生家长配合做好家庭清积水、灭蚊虫工作。	今古洲社区	年底	
	12. 要加强辖区内各主要排污渠、垃圾中转站、主次干道花圃及园林绿化场所等环境卫生及城区下水道“四防”装置的补装及维护工作, 落实区内河道、排污渠及各下水道、沙井的清疏任务。督促加强对所辖的屋顶水箱（无物业管理的屋顶水箱）、主次干道花圃、以及城区内公园、绿化带等地的清积水工作, 全面清除和控制蚊虫孳生地, 抓好灭蚊、防蚊措施的落实。牵头督促废旧物资收购站（点）等单位的环境卫生治理和防蚊灭蚊工作。	公用事业办 今古洲社区	年底	

工作任务	工作内容及要求	责任单位	完成时限	工作完成简要情况
三、强化日常蚊媒防控工作,落实以环境治理为主的蚊媒控制措施,有效控制蚊媒密度。	13. 加强辖区内企事业单位、建筑工地、物业小区的环境卫生治理和防蚊灭蚊工作;督促小区物管落实小区内及周边下水道“四防”装置的补装及维护工作;督促区内企事业单位、建筑工地、小区物管部门聘请专业消杀队伍有效开展灭蚊工作,加强对建筑工地有关人员的宣传教育,做到有病及时就医,及时报告。	经济办 建环办 今古洲社区	年底	
	14. 督促各类集贸市场、宾馆饭店、药品经营单位、食品生产加工单位、食品销售和餐饮服务门店及个体工商户做好卫生管理工作,清除蚊虫孳生地和栖息场所,及时消灭成蚊。	开发区市场监督 管理所	年底	
	15. 督导检查本单位开展登革热防控工作。负责依法、及时、妥善地处置与登革热疫情有关的治安事件,密切关注网络舆情,利用登革热事件进行的违法犯罪活动,切实维护社会稳定。协助开发区落实重症登革热病人强制隔离措施。	今古洲派出所 社会事务办	年底	
	16. 负责组织和动员辖区内全体职工、青年、妇女积极参与登革热防控工作;根据工作要求,做好职工、青年、妇女防控登革热宣传教育工作;指导管辖内的各类教育、培训单位开展登革热防控工作。	总工会 团委 妇联	年底	

工作任务	工作内容及要求	责任单位	完成时限	工作完成简要情况
三、强化日常蚊媒防控工作，落实以环境治理为主的蚊媒控制措施，有效控制蚊媒密度。	17. 负责组织辖区登革热疫情监测、蚊媒监测、疫情调查处置工作；开展蚊媒密度应急监测，评估灭蚊和清除孳生地的效果；开展健康教育；负责登革热预防防控工作提供技术指导。配合卫生健康部门做好相关信息发布、风险沟通等工作，完成卫生健康部门布置的有关工作。	公用事业办 开发区医院 今古洲社区	年底	
	18. 开展环境卫生整治统一行动。严格执行广东省爱卫会《关于机关团体企事业单位率先落实“三个一”环境卫生整治制度的通知》（粤爱卫〔2018〕12号）精神，使“三个一”环境卫生制度落到实处。部署、发动并督促本单位按照要求统一开展单位内外的环境卫生整治行动。加强城市主干道和内街内巷公共外环境、建筑工地和物业小区、公园和景点、学校、医院等重点区域的环境卫生整治，及时、有效清除蚊媒孳生地。按照属地管理原则组织社区、督促有关机关、社会团体、企事业单位每周进行1次环境卫生大扫除，严格落实“门前三包”制度和门内卫生达标责任制。	登革热防控工作小组 成员单位	年底	

附件 2

新会区病媒生物预防控制有偿服务机构备案名单

单位	地址	联系电话	备案项目
江门市卫生有害生物预防控制服务中心	江门市蓬江区尚行里 1 号首层	3332193	鼠、蚊、蝇、蟑螂、蚤病媒生物预防控制
新会区卫生消毒杀虫服务站	新会区会城华侨新村 5 号 501	6613277 13702235384	白蚁防治、除四害
新会区维宇城市害虫防治有限公司	新会区会城圭峰路 10 号 104-107	6676323 13316741178	白蚁防治、除四害
广东惠利民有害生物防治工程有限公司	江门市双龙广场金龙阁 1 栋 203 号	13676242322	病媒生物防治
江门市力建白蚁防治有限公司	新会区人民路 34 号 106	8260750 13426736764	白蚁防治、除虫害、除四害
新会区会城爱卫第二服务部	新会区会城镇前路 19 号	6618299	白蚁防治、除四害
新会区会城德业环境虫害防治中心	新会区会城冈州大道中 13 号 101	18128280818	白蚁防治、除四害
新会区保绿城市害虫防治有限公司	江门市新会区会城沪湾路 2 号 113	6684848 13316741178	白蚁防治、蚊、鼠、蝇、蟑螂、蚤等病媒生物预防控制
新会区科城白蚁灭鼠杀虫防治有限公司	新会区惠民东路 10 号	6660009	白蚁防治、除四害
江门市广信白蚁害虫防治有限公司	新会区会城明兴路 19 号 1 座 106	6783782 13392503782	白蚁防治、除四害
江门市天安白蚁防治工程有限公司	新会区会城五谷里 20 号 103	6325362 13923071115	虫害防治及灭杀工程（鼠、蚊、蝇、蟑螂、蚤类等病媒生物）

附件 3

学校防蚊灭蚊工作指引（2018 年版）

防蚊灭蚊最有效的措施就是清除或控制蚊虫孳生地（积水），消除蚊虫产生的源头。学校日常灭蚊主要的工作就是清理或控制蚊媒孳生地，只有当发生蚊媒传染病，或成蚊密度影响学校日常教学、学习时，才启动应急杀灭成蚊行动。

一、学校内常见孳生地及处理方法

（一）孳生地类型。

1. 各种闲置盆罐、饮料罐、食品盒、玻璃瓶等废弃容器积水，绿化灌木丛中散在垃圾形成的积水。
2. 室内外各种花盆及托盘、水生植物、盆景积水。
3. 建筑反壅、排水沟积水。
4. 喷水池、景观池、消防水池、饮用蓄水池。
5. 地面停车场存在的轮胎、排水沟；地下停车库集水井、抽水泵积水。
6. 下水道、沉沙井、洼地积水。
7. 教学苗圃内花盆托盘、水生植物（万年青、富贵竹、莲花等）、盆景积水；淋花器具。
8. 厕所便池积水，尤其是寒暑假期间长期没人居住的学生宿舍。
9. 其他可形成积水的容器。

（二）处理方法。

1. 搞好环境卫生。清除一切卫生死角，绿化灌木丛中散

在垃圾容易被忽视，应定期检查清理；翻盆倒罐清除各种小型积水，对一时无法清除的容器，应翻转倒扣放置并确保不会造成第二次积水。

2. 搞好基础设施建设。实行沟渠硬底化和暗渠化，定期疏通，保持通畅；各类沉沙井口应安装防蚊闸，地下停车库集水井等井口要密封处理或纱网密封，防止蚊虫孳生。

3. 科学种养水生植物。倡导采用防蚊篮花瓶或用沙石种养水生植物，如用一般的花瓶种养，则应每3~5天检查一次，发现有蚊虫（幼虫或蛹）孳生须换水，并彻底洗刷容器内壁并冲洗植物根部。有蚊幼或卵的水须倒入便池冲走。

4. 大型蓄水容器。对莲花缸（池）、景观池，倡导养鱼（例如食蚊鱼、斗鱼、金鱼等）；消防水池、饮用蓄水池应定期检查清洗，并加盖密闭。

5. 废旧轮胎中积水。应将轮胎叠放整齐并存放在室内或避雨的场所；对用于防撞的轮胎，应在轮胎底部打孔并固定，确保轮胎孔处于最底部，使积水能够顺畅流出。

6. 一时难以清除的积水。在积水中倒入少量废机油，形成一层油膜。或直接在水体表面均匀投入药物，可用的药物有：苏云金杆菌以色列变种（Bti）颗粒剂或乳剂。用量为每平方米水体1~2克；0.5%的吡丙醚颗粒剂，用量为每平方米水体1~2克；1%的双硫磷颗粒剂，用量为每平方米水体0.5~1克。

二、学校周边孳生地清理

为有效控制学校内蚊虫密度，应对学校外围周边50~

100米范围内的一切蚊虫孳生地进行彻底清理，否则，学校内蚊虫密度难以得到有效控制。

三、杀灭成蚊

在办公室、教室及其他室内发现有成蚊时，应选用家用卫生杀虫剂，如市售有合格证号的杀虫气雾剂（含拟除虫菊酯药物）。施药前先关闭门、窗。将气雾罐充分摇匀，手持气雾罐朝上30度角，按压阀门从里到外向空间喷雾，按15m²房间约需喷雾10~15秒钟。同时重点喷洒各类柜后、床、台、桌底下、沙发下、墙脚线、杂物处，每处约喷3~5秒钟。施药后人员离开，0.5~1小时后再打开门、窗通风20分钟后，人方可进入室内。

也可采用市售灭蚊片，按使用说明书一般15m²使用1片，点燃后关闭门、窗，0.5~1小时后再打开门、窗通风20分钟后，人方可进入室内。

如校园需要大面积杀灭成蚊，建议聘请专业的有害生物防制公司开展杀灭成蚊工作，化学法快速杀灭成蚊方法主要有超低容量喷雾法及热烟雾剂法；化学法持续滞留杀灭成蚊的方法有室内滞留喷洒法及室外绿篱技术喷洒法。

四、药物使用安全注意事项

必须选用有农药登记证的卫生用杀虫剂。本指引中推荐的药物都是对人畜毒性较低的卫生杀虫剂，但仍需注意安全，需将药物保存在儿童不易获取的地方，避免儿童触碰或误食。同时接触药物后应洗手。

附件 4

医疗机构防蚊灭蚊工作指引（2018 年版）

防蚊灭蚊最有效的措施就是清除或控制蚊虫孳生地（积水），消除蚊虫产生的源头。医疗机构日常灭蚊主要的工作就是清理或控制蚊媒孳生地，只有当发生蚊媒传染病，或成蚊密度高影响医院日常医治工作、群众就医时，才启动应急杀灭成蚊行动。

一、医疗机构内常见孳生地及处理方法

（一）孳生地类型。

1. 各种闲置盆罐、饮料罐、食品盒、玻璃瓶等废弃容器积水，绿化灌木丛中散在垃圾形成的积水。
2. 室内外各种花盆及托盘、水生植物、盆景积水。
3. 建筑反坎、排水沟积水。
4. 喷水池、莲花缸（池）、景观池、消防水池、饮用蓄水池。
5. 停车场存在的轮胎、排水沟、地下停车库集水井、抽水泵积水。
6. 下水道、沉沙井、洼地积水。
7. 花盆托盘、水生植物（万年青、富贵竹、莲花等）、盆景积水；淋花器具。
8. 其他可形成积水的容器。

（二）处理方法。

1. 搞好环境治理。清除一切卫生死角，绿化灌木丛中散在垃圾容易被忽视，应定期检查清理；翻盆倒罐清除各种小型积水，对一时无法清除的容器，应翻转倒扣放置并确保不会造成第二次积水。

2. 搞好基础设施建设。实行沟渠硬底化和暗渠化，定期疏通，保持通畅；各类沉沙井口应安装防蚊闸，地下停车库集水井等井口要密封处理或纱网密封，防止蚊虫孳生。

3. 科学种养水生植物。倡导采用防蚊花篮瓶或用沙石种养水生植物，如用一般的花瓶种养，则应每3~5天检查一次，发现有蚊虫（幼虫或蛹）孳生须换水，并彻底洗刷容器内壁并冲洗植物根部。有蚊幼或蛹、卵的水须倒入便池冲走。

4. 大型蓄水容器。对莲花缸（池）、景观池，倡导养鱼（例如食蚊鱼、斗鱼、金鱼等）；消防水池、饮用蓄水池应定期检查清洗，并加盖密闭。

5. 废旧轮胎中积水。应将轮胎叠放整齐并存放在室内或避雨的场所；对用于防撞的轮胎，应在轮胎底部打孔并固定，确保轮胎孔处于底部，使积水能够顺畅流出。

6. 一时难以清除的积水。在积水中倒入少量废机油，形成一层油膜。或直接在水体表面均匀投入药物，可用的药物有：苏云金杆菌以色列变种（Bti）颗粒剂或乳剂。用量为每平方米水体1~2克；0.5%的吡丙醚颗粒剂，用量为每平方米水体1~2克；1%的双硫磷颗粒剂，用量为每平方米水体0.5~1克。

二、医疗机构周边孳生地清理

为有效控制医疗机构院内蚊虫密度，应对院区外围周边50~100米范围内的一切蚊虫孳生地进行彻底清理，否则，院内蚊虫密度难以得到有效控制。

三、室内防蚊

收治蚊媒传染病的病房，必须有完善的防蚊设施。病房所有的门、窗、排气口必须安装防蚊纱网，纱网筛目小于20目（筛孔平均边长0.9mm）。必要时可在纱网上均匀喷涂市售家用气雾剂。

四、杀灭成蚊

在办公室、病房及其他室内发现有蚊虫成蚊时，应选用家用卫生杀虫剂，如市售有合格证号的杀虫气雾剂（含拟除虫菊酯药物）。施药前先关闭门、窗。将气雾罐充分摇匀，手持气雾罐朝上30度角，按压阀门从里到外向空间喷雾，按15m²房间约需喷雾10~15秒钟。同时重点喷洒各类柜后、床、台、桌底下、沙发下、墙脚线、杂物处，每处约喷3~5秒钟。施药后人员离开，0.5~1小时后再打开门、窗通风20分钟后，人方可进入室内。

也可采用市售灭蚊片，按使用说明书一般15m²使用1片，点燃后关闭门、窗，0.5~1小时后再打开门、窗通风20分钟后，人方可进入室内。

如院内需要大面积杀灭成蚊，建议聘请专业的有害生物防制公司开展杀灭成蚊工作，化学法快速杀灭成蚊方法主要

有超低容量喷雾法及热烟雾剂法；化学法持续滞留杀灭成蚊的方法有室内滞留喷洒法及室外绿篱技术喷洒法。

五、药物使用安全注意事项

必须选用有农药登记证的卫生用杀虫剂。本指引中推荐的药物都是对人畜毒性较低的卫生杀虫剂，但仍需注意安全，需将药物保存在儿童不易获取的地方，避免儿童触碰或误食。同时接触药物后应洗手。

附件 5

建筑工地防蚊灭蚊工作指引（2018 年版）

防蚊灭蚊最有效的措施就是清除或控制蚊虫孳生地（积水），消除蚊虫产生的源头。建筑工地日常灭蚊主要的工作就是清理或控制蚊媒孳生地，当未能有效控制蚊虫孳生地、成蚊密度高时，就要启动应急杀灭成蚊行动。

一、建筑工地常见孳生地及处理方法

（一）蚊虫孳生地场所。

1. 建筑工地的沟渠、沙井、地下积水、电梯井、排水深井、蓄水池、打桩洞、坑洼地。
2. 各种露天器械设备、塑料布、轮胎。
3. 工棚房前屋后的盆罐等积水容器。
4. 其他可形成积水的容器。

（二）处理方法。

1. 对沟渠实行硬底化，保持流水畅通。及时排干地面积水、打桩洞及电梯井积水。填平工地内所有凹凸不平的坑洼。

2. 每天及时清运垃圾，并清理工地范围内的各种散在积水垃圾容器，如一次性饭盒、水杯、矿泉水瓶等，清除卫生死角。

3. 定期检查工地范围内的各种容器积水，如建筑材料、水桶、塑料薄膜等，将这些容器积水清理、加盖或反扣，并确保不会造成第二次积水。

4. 废旧轮胎中积水治理。应将轮胎叠放整齐并存放在室内或避雨的场所。如堆放在室外，应用防雨布严密遮盖，并要防止防雨布上雨水积存；对用于防撞的轮胎，应在轮胎底部打孔并固定，确保孔处于底部，使积水能够顺畅流出。

5. 一时难以清除积水治理。在积水中倒入少量废机油，形成一层油膜。或直接在水体表面均匀投入药物，可用的药物有：苏云金杆菌以色列变种（Bti）颗粒剂或乳剂。用量为每平方米水体 1~2 克；0.5%的吡丙醚颗粒剂，用量为每平方米水体 1~2 克；1%的双硫磷颗粒剂，用量为每平方米水体 0.5~1 克。

二、杀灭成蚊

长效防蚊蚊帐是经世界卫生组织（WHO）认可，能有效驱避甚至杀死蚊虫的一类功能性纺织品。它不仅可以像传统蚊帐一样从空间上对蚊虫进行隔离，还可以用自身携带的杀蚊剂或驱避剂对蚊虫进行毒杀或驱避。所以在工地工人宿舍，采用长效防蚊蚊帐，可起到防蚊灭蚊双重效用，该方法尤其适用于蚊媒传染病流行区。如使用传统浸泡或喷洒蚊帐，必须由专业人员操作。常用药剂有 1%溴氰菊酯悬浮剂、10%顺式氯氰菊酯悬浮剂、2.5%高效氯氟氰菊酯微胶囊剂和 10%氯菊酯乳油。

在办公室、宿舍及其他室内发现有成蚊时，应选用家用卫生杀虫剂，如市售有合格证号的杀虫气雾剂（含拟除虫菊酯药物）。施药前先关闭门、窗。将气雾罐充分摇匀，手持

气雾罐朝上 30 度角，按压阀门从里到外向空间喷雾，按 15m² 房间约需喷雾 10~15 秒钟。同时重点喷洒各类柜后、床、台、桌底下、沙发下、墙脚线、杂物处，每处约喷 3~5 秒钟。施药后人员离开，0.5~1 小时后再打开门、窗通风 20 分钟后，人方可进入室内。

也可采用市售灭蚊片，按使用说明书一般 15m² 使用 1 片，点燃后关闭门、窗，0.5~1 小时后再打开门、窗通风 20 分钟后，人方可进入室内。

如工地需要大面积杀灭成蚊，建议聘请专业的有害生物防制公司开展杀灭成蚊工作，化学法快速杀灭成蚊方法主要有超低容量喷雾法及热烟雾剂法；化学法持续滞留杀灭成蚊的方法有室内滞留喷洒法及室外绿篱技术喷洒法。

三、药物使用安全注意事项

必须选用有农药登记证的卫生用杀虫剂。本指引中推荐的药物都是对人畜毒性较低的卫生杀虫剂，但仍需注意安全，需将药物保存在儿童不易获取的地方，避免儿童触碰或误食。同时接触药物后应洗手。

公园苗圃花卉市场防蚊灭蚊工作指引 (2018 年版)

防蚊灭蚊最有效的措施就是清除或控制蚊虫孳生地（积水），消除蚊虫产生的源头。公园、苗圃、花卉市场日常灭蚊主要的工作就是清理或控制蚊媒孳生地，只有当发生蚊媒传染病或成蚊密度高，影响日常生活时，才启动应急杀灭成蚊行动。

一、公园苗圃花卉市场常见孳生地及处理方法

（一）孳生地类型。

1. 公园的奇石、假山、雕塑、树洞积水、储水植物（如竹头、芭蕉、旅人蕉、海芋等）；绿化灌木丛中散在垃圾形成的积水；卡丁车等游乐车场防撞轮胎；湖泊、池塘、喷水池、景观池。

2. 苗圃和花卉市场的花盆托盘、水生植物（万年青、富贵竹、莲花等）、盆景积水；淋花器具。

3. 停车场存在的轮胎、排水沟。

4. 各种闲置盆罐、饮料罐、食品盒、玻璃瓶等废弃容器积水。

5. 下水道、沉沙井、低洼地积水。

6. 其他可形成积水的容器。

（二）处理方法。

1. 搞好环境治理。清除一切卫生死角，绿化灌木丛中散在垃圾容易被忽视，应定期检查清理；翻盆倒罐清除各种小型积水，对一时无法清除的容器，应翻转倒扣放置并确保不会造成第二次积水。

2. 搞好基础设施建设。实行沟渠硬底化和暗渠化，定期清疏，保持通畅；各类泥沙井口应安装防蚊闸，地下停车库集水井需密封，纱网筛目小于 20 目（筛孔平均边长 0.9mm）。填平地面低洼种水处。

3. 科学种养水生植物。倡导采用防蚊花篮瓶或用沙石种养水生植物，如用一般的花瓶种养，则应每 3~5 天检查一次，发现有蚊虫（幼虫或蛹）孳生须换水，并彻底洗刷容器内壁并冲洗植物根部。

4. 大型蓄水容器治理。对莲花缸（池）、喷水池、景观池，倡导养鱼（例如食蚊鱼、斗鱼、金鱼等）；对消防水池可视蚊虫消长情况，适时施放灭蚊幼杀虫剂。饮用蓄水池应每定期检查清洗，并加盖密闭。

5. 废旧轮胎中积水治理。应将轮胎叠放整齐并存放在室内或避雨的场所。如堆放在室外，应用防雨布严密遮盖，并要防止防雨布上雨水积存；对用于防撞的轮胎，应在轮胎底部打孔处理，使积水能够顺畅流出。

6. 湖泊、池塘治理。离岸边 1 米处挖深，清理湖底淤泥，清除岸边杂草、漂浮垃圾。依实际情况可放养食蚊鱼、观赏鱼或食用鱼。

7. 一时难以清除积水治理。在积水中倒入少量废机油，形成一层油膜。或直接在水体表面均匀投入药物，可用的药物有：苏云金杆菌以色列变种（Bti）颗粒剂或乳剂。用量为每平方米水体 1~2 克；0.5%的吡丙醚颗粒剂，用量为每平方米水体 1~2 克；1%的双硫磷颗粒剂，用量为每平方米水体 0.5~1 克。

二、杀灭媒介伊蚊成蚊

在公园办公室及其他室内发现有蚊虫成蚊时，应选用家用卫生杀虫剂，如市售有合格证号的杀虫气雾剂（含拟除虫菊酯药物）。施药前先关闭门、窗。将气雾罐充分摇匀，手持气雾罐朝上 30 度角，按压阀门从里到外向空间喷雾，按 15m² 房间约需喷雾 10~15 秒钟。同时重点喷洒各类柜后、床、台、桌底下、沙发下、墙脚线、杂物处，每处约喷 3~5 秒钟。施药后人员离开，0.5~1 小时后再打开门、窗通风 20 分钟后，人方可进入室内。

也可采用市售灭蚊片，按使用说明书一般 15m² 使用 1 片，点燃后关闭门、窗，0.5~1 小时后再打开门、窗通风 20 分钟后，人方可进入室内。

如公园苗圃花卉市场需要大面积杀灭成蚊，建议聘请专业的有害生物防制公司开展杀灭成蚊工作，化学法快速杀灭成蚊方法主要有超低容量喷雾法及热烟雾剂法；化学法持续滞留杀灭成蚊的方法有室内滞留喷洒法及室外绿篱技术喷洒法。

三、药物使用安全注意事项

必须选用有农药登记证的卫生用杀虫剂。本指引中推荐的药物都是对人畜毒性较低的卫生杀虫剂，但仍需注意安全，需将药物保存在儿童不易获取的地方，避免儿童触碰或误食。同时接触药物后应洗手。

附件 7

各类场所化学快速杀灭成蚊指引（2018 年版）

防蚊灭蚊最有效的措施就是清除或控制蚊虫孳生地（积水），消除蚊虫产生的源头。日常防蚊灭蚊主要的工作就是清理或控制蚊媒孳生地，只有当发生蚊媒传染病，或成蚊密度高影响到日常工作、生活时，才启动应急杀灭成蚊行动。

一、化学杀灭成蚊原则

（一）杀虫药物的选择。

应选用敏感药物或低度抗药性药物。敏感药物可正常使用；低度抗性药物根据当地抗性水平调整用药剂量；中度抗性药物以限制其使用次数为原则，以延缓抗性发展；高度抗性药物应暂停使用，其与快速击倒药物复配时在应急灭蚊时可酌情使用。

（二）杀虫剂剂型的选择。

不同场所、不同施药方式选用的剂型各不相同。在外环境进行超低容量喷雾或室内空间喷雾，应选取乳油、乳剂；在室内进行重点滞留喷洒或室外的绿篱技术应选用悬浮剂、可湿性粉剂、微胶囊剂，应选用有持效作用的杀虫剂，如氯氰菊酯系列品种、高效氯氟氰菊酯等。

（三）喷雾器的选择。

超低容量喷雾或室内空间喷雾应选用机动、电动超低容量喷雾器（雾粒 $25 \sim 50 \mu\text{m}$ ）、气雾罐；滞留喷洒应选用常

量(雾粒大于 $400\mu\text{m}$)或高容量喷雾器(雾粒 $200\sim 400\mu\text{m}$);绿篱技术应选用低容量喷雾器(雾粒 $100\sim 200\mu\text{m}$)。

二、办公场所、课室、家居杀灭成蚊

此类环境因与人体关系密切,对杀虫剂安全性有更高的要求,应选用家用卫生杀虫剂,如市售有合格证号的杀虫气雾剂(含拟除虫菊酯药物)。施药前先关闭门、窗。将气雾罐充分摇匀,手持气雾罐朝上 30° 角,按压阀门从里到外向空间喷雾,按 15m^3 房间约需喷雾 $10\sim 15$ 秒钟。同时重点喷洒各类柜后、床、台、桌底下、沙发下、墙脚线、杂物处,每处约喷 $3\sim 5$ 秒钟。施药后人员离开, $0.5\sim 1$ 小时后再打开门、窗通风20分钟后,人方可进入室内。

也可采用市售灭蚊片,按使用说明书一般 15m^2 使用1片,点燃后关闭门、窗, $0.5\sim 1$ 小时后再打开门、窗通风20分钟后,人方可进入室内。

三、大面积室内场所杀灭成蚊

大面积场所室内主要包括体育馆、礼堂、大型会议室等。

(一) 空间喷雾。

1. 药物

致死类药物如氯菊酯、氯氰菊酯系列品种、醚菊酯、右旋苯氰菊酯、右旋苯醚菊酯、杀螟松,击倒类药物如四氟醚菊酯、胺菊酯、丙烯菊酯系列品种等杀虫剂。击倒类药物不宜单独使用,应与致死类药物复配。

2. 剂型

乳油、乳剂、水乳剂等剂型。

3. 喷雾器

背负机动式、手提电动、手推式机动超低容量喷雾器，将雾粒调至 $25 \sim 50 \mu\text{m}$ 大小。

4. 施药浓度及施药量

药物按产品使用说明书进行稀释，一般是用自来水按 $30 \sim 50$ 倍稀释，喷药量为 $0.5\text{ml}/\text{m}^3$ 。根据喷雾器流量、施药量和空间大小确定喷雾时间。

$$\text{喷雾时间 (min)} = \frac{\text{空间体积 (m}^3\text{)}}{\text{流量 (ml/min)}} \times \text{喷药量 (ml/m}^3\text{)}$$

5. 施药部位

从里到外，喷头朝上 30° 向空间均匀喷雾。

(二) 室内重点滞留喷洒。

1. 药物

高效氯氟氰菊酯、氯氟菊酯系列品种、溴氰菊酯、残杀威等杀虫剂。

2. 剂型

微胶囊剂、悬浮剂、可湿性粉剂、水分散颗粒剂等剂型。

3. 喷雾器

手动式压力喷壶、背负式或手推式机动常量喷雾器，将雾粒调至 $200 \mu\text{m}$ 以上。

4. 配制浓度及喷药量

药物按产品使用说明书进行稀释，一般是根据物品表面

的吸水性，用自来水按50~100倍稀释，以均匀喷洒后物品表面湿而不滴为宜，在全吸收表面如水泥石灰表面施药量为80ml/m²，在半吸收表面如木板表面施药量为50ml/m²，在不吸收表面如瓷砖或不锈钢板表面施药量为30 ml/m²。

5. 施药部位

1米以下墙脚，柜背面、台、桌、椅等底背处。

6. 施药时间及频次

发生疫情时，每2周施药1次。

四、室外持效控制成蚊方法

采用绿篱技术法。绿篱技术法是指根据白纹伊蚊喜爱栖息于室外植被阴凉环境的特点，采用低容量的喷雾器将长效杀虫药剂喷洒在建筑物周围环境的灌木篱笆或植被叶片表面和背面，以达到对蚊虫长期、有效的杀灭效果。绿篱技术对药物、剂型、喷雾器、施药部位及施药方式等有特定的要求。

（一）药物。

高效氯氟氰菊酯、顺式氯氟菊酯、高效氯氟菊酯、溴氰菊酯等具有长效滞留杀灭的杀虫剂。

（二）剂型。

微胶囊剂、可湿性粉剂、悬浮剂等剂型。

（三）喷雾器。

背负式或手推式机动低容量喷雾器，将雾粒调至100 μm~200 μm大小。

（四）配制浓度。

因为植被的吸水量较低，施药浓度适当比推荐提高，如推荐使用是稀释100倍，则绿篱技术是稀释25～50倍。

（五）施药时间。

天晴时候施药。

（六）施药部位及方式。

重点喷洒社区建筑物周围的2m以下灌木绿化篱笆和灌木丛，内街小巷绿化带，公园2m以下竹林、灌木绿篱、灌木丛，马路两侧绿篱。尽量将药物施于植被枝叶向下背阴表面白纹伊蚊栖息的部位，喷头应从下往上斜30度角向上均匀喷雾，以灌木叶片湿而不滴为宜。

五、室外快速杀灭成蚊

（一）超低容量喷雾法。

超低容量喷雾技术是通过特定的喷雾器，将少量的高浓度的杀虫剂切割成细小的颗粒，均匀撒布在较大的区域内，使其发好的杀虫效果。超低容量喷雾技术对药物、剂型、喷雾器、施药方式及有关的气象条件等有特定的要求。

1. 药物

致死类药物如氯菊酯、氯氰菊酯系列品种、醚菊酯、右旋苯氰菊酯、右旋苯醚菊酯、杀螟松，击倒类药物如四氟醚菊酯、胺菊酯、丙烯菊酯系列品种等杀虫剂。击倒类药物不宜单独使用，应与致死类药物复配。

2. 剂型

乳油、乳剂、水乳剂等剂型。

3. 喷雾器

背负式、手推或车载机动超低容量喷雾器，将雾粒调至 $25\mu\text{m} \sim 50\mu\text{m}$ 大小。

4. 配制浓度及施药量

选用超低容量喷雾时，药物按产品使用说明书进行稀释，一般是用自来水按20~30倍稀释，根据喷雾器的流量、射程、施药量确定喷雾移动速度。

$$\text{喷雾移动速度 (m/min)} = \frac{\text{流量 (ml/min)}}{\text{每平方米喷洒量 (ml/m}^2\text{)} \times \text{射程 (m)}}$$

5. 施药时间

如杀灭对象为伊蚊最佳施药时间是早上7~10时和下午4~7时。发生疫情时，每2~3天施药一次。

6. 气象要求

超低容量喷雾要求风速1~4m/s，当风速超过4m/s时，会影响杀灭效果。

(二) 热烟雾喷雾法。

热烟雾一般宜在相对密闭的环境进行喷雾，因其雾粒小（小于 $5\mu\text{m}$ ），渗透效果好，在无风或微风情况下，也可在植被茂密、环境复杂的外环境进行杀灭成蚊。

1. 药物

致死类药物如氯菊酯、氯氰菊酯系列品种、醚菊酯、右旋苯氰菊酯、右旋苯醚菊酯、杀螟松，击倒类药物如四氟醚

菊酯、胺菊酯、丙烯菊酯系列品种等杀虫剂。击倒类药物不宜单独使用，应与致死类药物复配。

2. 剂型

油剂。

3. 喷雾器

热烟雾器。

4. 配制浓度及施药量

按使用说明配制。根据喷雾器的流量、射程、施药量确定喷雾移动速度。

$$\text{喷雾移动速度 (m/min)} = \frac{\text{流量 (ml/min)}}{\text{每平方米喷洒量 (ml/m}^2\text{)} \times \text{射程 (m)}}$$

5. 施药时间

如杀灭对象为伊蚊，最佳施药时间是早上7~10时和下午4~7时。

6. 气象要求

热烟雾喷雾要求风速小于1m/s，当风速超过1m/s时，会影响杀灭效果。

六、药物使用安全注意事项

必须选用有农药登记证的卫生用杀虫剂。本指引中推荐的药物都是对人畜毒性较低的卫生杀虫剂，但仍需注意安全，需将药物保存在儿童不易获取的地方，避免儿童触碰或误食。同时接触药物后应洗手。